



Zaživimo!

Postopki čiščenja ob epidemiji

Zaščita varovancev in zaposlenih v okolju z visokim tveganjem



Obvladovanje okužbe v okolju

Dobri standardi za preprečevanje in obvladovanje okužb odražajo splošno kakovost oskrbe in spodbujajo zaupanje v kakovost oskrbe varovancev in njihovih družin.

Vaše osebje in varovanci so lahko soočeni z epidemijo SARS-CoV-2 (novim koronavirusom), zato je treba zagotoviti varno bivalno in delovno okolje.

Postopki čiščenja in razkuževanja za posamezna območja ponujajo jasne smernice glede previdnostnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe ter zaščito varovancev in osebja pred okužbo, kot tudi za omejitev širjenja, če pride do epidemije.





Ključni prostori, ki jih je treba čistiti in razkuževati ob epidemiji v objektu

Čiščenje ob epidemiji: Med izbruhom specifične bolezni, kot je epidemija COVID-19, lahko v domu za dolgotrajno oskrbo sprejmejo višji standard osebne higijene. Vendar pa bo ta standard upoštevan le nekaj tednov oziroma do konca epidemije.

Za to stopnjo je značilna obsežna uporaba osebne varovalne opreme in postavljanje ustreznih znakov/obvestil glede omejitev, ki veljajo za obiskovalce objekta.

Globinsko čiščenje/ponovno odprtje: Po začasnem zaprtju objekta ali njegovega dela oziroma po končani epidemiji boste morda želeli opraviti »globinsko čiščenje«, da objekt pripravite na ponovno uvajanje standardne higienske prakse. Higienski postopek globinskega čiščenja se izvaja enkratno, običajno po epidemiji in šele takrat, ko ni več aktivnih okužb.

SPLOŠNO DOSTOPNI PROSTORI

Vhod v objekt,
preddverje
Pisarne za osebje

PROSTORI Z VISOKIM TVEGANJEM

Javne sanitarije
Prostori za
človeške izločke
Mrtvašnica

BIVALNI PROSTORI

Sestrskasoba
Prostori za
izolacijo

PRALNICA

Pranje perila

KUHINJSKI PROSTORI

Kuhinja
Soba za odmor
osebja
Jedilni
prostori

PROSTORI ZA AKTIVNOSTI*

Skupni prostor
Računalniška soba
Prostori za fitnes
Lepotilni prostor

*Razmislite o omejitvi uporabe in sprejmite dodatne previdnostne ukrepe za preprečevanje izpostavljenosti



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Vhod v objekt/preddverje

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak


- Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za smeti z modro krpo, če je potrebno.
- Očistite vse mize. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam
- Očistite stole, posebno natančno očistite naslonjala za roke na stolihi
- Očistite telefon, tipkovnico, miško
- Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke
- Očistite tla

Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Stikala



Mize, sprejemni pult



Vrata



Kljuke



Pokrov koša za smeti



Klicne tipke



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Nasloni za roke naslanjačev



Tipke v dvigalu




Telefon

Kako pogosto?



Na vsake 4 ure in kadar so umazane



S čim?*

Čistilo razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Okna in ogledala



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

TASKI Swingo 350B/Aero 8



PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavržite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Vhod v objekt in/ali sprejemnica

1. Merjenje telesne temperature (brezstično) in/ali drugi postopki ocene zdravstvenega stanja pred vstopom v objekt. Vidno bolnim osebam ne sme biti dovoljen vstop v objekt.
2. Fizična ločitev obiskovalca pred vstopom v preddverje, kar vključuje pregrade (vrata, pregradna stena itn.)
3. Podajalnik sredstva za higieno rok in znak, da je obvezno izvajanje higiene rok pred vstopom v objekt. Najbolje je uporabiti umivalnik za roke.
4. Pripravite urnik razkuževanja kljuk, pulta in pisala na vsakih X ur. Postavitev posode z razkužilnimi robčki in koša za smeti ob vratih za primer potrebe po dodatnem brisanju površin.
5. Postavitev robčkov za obraz na vhodu
6. Postavitev znaka, ki opozarja, da na vhodu ne sme biti več kot X oseb hkrati
7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
8. Uporaba mask je lahko primerna, kadar obstaja večje tveganja ali ko ni možno omejevanje socialnih stikov.

Preddverje in hodniki

1. Poslovni obiskovalci naj uporabljajo maske večino časa. Osebjem naj uporabljajo maske v obdobjih povečanega tveganja.
2. Omejevanje socialnih stikov med osebjem in varovanci ob srečanju v teh prostorih.
3. Postavitev podajalnikov sredstva za higieno rok in znakov na ustreznih razmikih.
4. Postavitev podajalnikov robčkov za obraz in košev za smeti na ustreznih razmikih.
5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v določenem območju ne sme biti več kot X oseb hkrati
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.

Podesti, dvigala in stopnišča

1. Poslovni obiskovalci naj uporabljajo maske večino časa. Osebjem naj uporabljajo maske v obdobjih povečanega tveganja.
2. Omejevanje socialnih stikov med osebjem in varovanci ob srečanju v teh prostorih. Omejite število oseb za hkratno uporabo dvigala.
3. Podajalnik sredstva za higieno rok in robčkov za obraz naj bodo na voljo pri dvigalu in na stopniščnih podestih
4. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja v dvigalih in na stopniščih je lahko težavno, saj je večina projektirana tako, da ne omogoča zadostnega prezračevanja. Mogoče bo treba v rednih presledkih držati odprta vrata dvigala, da se omogoči izmenjava zraka v dvigalu, ali zahtevati obvezno uporabo mask v dvigalu. Za stopnišča je možna prilagoditev prezračevalnih sistemov, da se zagotovi zadostna izmenjava zraka.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Pisarna za osebe

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak

- Očistite vse mize (čistite od manj onesaženih površin proti bolj onesaženim površinam)
- Očistite stole, posebno natančno očistite naslonjala za roke na stolih
- Očistite telefon, tipkovnico, miško
- Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?




Enkrat na dan in kadar je umazano



Kako pogosto?



Na vsake 4 ure in kadar so umazane



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Stikala



Pohištveni ročaji



Telefon



Kljuke



Pokrov koša za smeti



Površine, ki se jih dotikamo z rokami: tipkovnica, kopirne naprave, računalnik, monitorji



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Mize in stoli



Stikalo za namizno svetilko

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke

S čim?*

Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Okna



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Čistilni voziček



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Sesalnik Aero 8



Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

*For viruses
**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to local availability



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Pisarna za osebje

Opredelitev potencialnega tveganja: Osebje morda mora delati na majhni medsebojni razdalji, brez možnosti za ustrezno omejevanje socialnih stikov. Preko površin v pisarni, ki se jih osebe pogosto dotikajo (kopirni stroj, kavni avtomat, vrata/kljuge, prostori za oskrbo), se virusi lahko prenesejo z osebe na osebo. Če vrata nimajo možnosti samodejnega odpiranja, lahko z dotikanjem kljuk pride do onesnaženja rok pri osebju oziroma do onesnaženja kljuk.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Ustrezna fizična razdalja med zaposlenimi, vključno z omejevanjem socialnih stikov, ali uporaba pregrad.
2. Postavitev podajalnika sredstva za higieno rok in znak, da je v pisarni obvezno izvajanje higiene rok.
3. Redno razkuževanje površin, ki se jih osebe pogosto dotikajo, kot so kopirni stroji, vrata in kljuge, smetnjaki itn.
4. Postavitev robčkov za obraz, tako da jih zaposleni lahko brez težav dosežejo
5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v pisarni ne sme biti več kot X oseb hkrati
6. Uporaba mask naj bo obvezna v času povečanega tveganja in izbirna za osebje v drugih primerih.
7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Prostor za izolacijo

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO




1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

- Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak. Začnite v spalnici in nadaljujte v sanitarijah, v smeri od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam
- Odstranite vso posteljnino in jo odložite v vrečo za umazano perilo (kadar je primerno). Če je potrebno, zamenjajte s svežo posteljnino ali samo pospravite posteljo. Poročajte o morebitnih težavah v sobi.
- Očistite stikalo za luč, mizo, stole, telefon, posteljno mizico, klicno tipko/daljinec, ostale pripomočke v sobi, klimatsko napravo, posteljo varovanja, kljuko na vratih.
- Očistite in razkužite vse površine v sanitarijah, vključno s podajalnikom za milo/razkužilo, ogledali, umivalniki in kopalniškimi armaturami (čistite od manj onesnaženih proti bolj onesnaženim). Očistite in razkužite stranišča, vključno s straniščno desko in pokrovom ter splakovalnimi tipkami. Napolnite podajalnike sredstva za higieno rok in toaletnega papirja itn.
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke. Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

- | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | Nasloni za roke naslanjačev | | Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti) | | Pohištveni ročaji | | Glava prhe |
| | Stikala | | Umivalnik | | Kljuke | | Ostali pripomočki v sobi (grelnik vode, likalnik, sušilnik za lase) |
| | Mize | | Upravljalnik klimatske naprave | | Balkonska ograja | | Daljinec |
| | | | | | Straniščna deska, splakovalne tipke, ločilna stena | | Telefon |
| | | | | | Armature za tuš, pipe | | Stikalo za namizno svetilko |

Kako pogosto?




Na vsaki 2 uri čez dan in kadar je umazano



S čim? **

Razkuževanje stranišč



TASKI SANI 4 IN 1 PLUS**
Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Razkuževanje sanitarij



***OXIVIR EXCEL**
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Čistilno razkužilo za talne površine



***TASKI DEGERM**
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



Čistilno razkužilo za okna in druge površine



***OXIVIR EXCEL**
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Univerzalno čistilno razkužilo



***OXIVIR EXCEL**
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to local availability

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavržite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Bivalne sobe, vključno s kopalnicami in stranišči – soba za izolacijo

Opredelitev potencialnega tveganja: Varovanci objekta za dolgotrajno oskrbo, okuženi s patogeni, ki povzročajo epidemijo, bodo verjetno morali ostati v svojih sobah, zaradi česar je v teh prostorih pričakovano večje izločanje patogenov. Če sobo delijo z drugo osebo, bo tudi ona morala biti v karanteni skupaj z njimi. Osebe, ki vstopa v sobo brez izvajanja higijene rok ali uporabe ustrezne OVO, in obiskovalci, ki se jim dovoli vstop, so izpostavljeni dodatnemu tveganju, da se sami okužijo ali da patogene prenesejo na druge. Vsi materiali ali oprema, ki se vnesejo v sobo, so prav tako potencialni prenašalci patogenov.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih ali obiskovalcev, ki so med epidemijo lahko hkrati v sobi varovanca. Osebe v sobi morajo upoštevati pravila za omejevanje socialnih stikov.
2. Vsi, ki vstopajo v sobo varovanca, morajo izvajati higieno rok in uporabljati ustrezno OVO, ki lahko vključuje nošenje rokavic in halje z rokavi, uporabo mask in zaščite za obraz.
3. Obiske je treba prepovedati, če je varovanec okužen z organizmom, ki povzroča epidemijo.
4. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro. Koncentracijo respiratornega virusa v zraku je mogoče zmanjšati z ustreznim številom izmenjav zraka.
5. Vso opremo (čistilni pripomočki, brisala itn.), ki je bila prinesena v sobo, je treba ob odnašanju razkužiti.
6. Varovancu(-em) je treba zagotoviti obrok v sobi.
7. Osebe, ki pomaga pri kopanju, bo lahko potrebovalo dodatno OVO za zaščito pred škropljenjem



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Bivalna soba: odpust

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO




1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

- **Priprava.** Opravite higieno rok, nato si nadenite rokavice. Po potrebi uporabite dodatno OVO (zaščitna očala). Pri vходу v sobo postavite znak za spolzka tla. Odstranite smeti in infektivne odpadke. Odstranite vse perilo in odložite ga v vrečo za umazano perilo. Osebnih predmeti bolnika. Če so v sobi prisotne bolnikove stvari ali nevarni predmeti, pokličite negovalno osebje, da ga odstrani. Prijavite morebitne težave v sobi. Vodoravne površine in napeljave, na katerih se nabira veliko prahu. Očistite vidno umazano površino, ki se jih redko dotikajo.
- **Najprej očistite površine ob vhodu**, kot so držalo OVO, podajalnik za milo/razkužilo, kljuka.
- **Čiščenje nadaljujte v bivalnem prostoru** in najprej očistite stikalo za luč, zbiralnike za ostre predmete, mize, stole, telefon, posteljno mizico, klično tipko/daljinec, varovančevo posteljo in posteljno ograjo
- Nato **se preselite v toaletne prostore**. Popršite toaletni prostor, očistite vratno kljuko, stikalo za luč, umivalnik in ročaje, podajalnike za milo/razkužilo, prostor za tuširanje. Nazadnje očistite straniščno desko in školjko. Snemite rokavice in izvedite ustrezno higieno rok.
- **Zaključek.** Zamenjajte toaletni papir in sredstva za higieno rok. Posteljite posteljo s čisto posteljnino. Napolnite podajalnike sredstev za higieno rok. Uredite postavitev pohištva. Preverite svoje delo. Pobrišite tla. Snemite rokavice in opravite higieno rok.

Kako pogosto?



Enkrat ob odpustu varovanca




2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Kako pogosto?



Enkrat ob odpustu varovanca



- | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | Nasloni za roke naslanjačev | | Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti) | | Pohištveni ročaji | | Glava prhe |
| | Stikala | | Umivalnik | | Kljuka | | Ostali pripomočki v sobi (grelnik vode, likalnik, sušilnik za lase) |
| | Mize | | Upravljalnik klimatske naprave | | Balkonska ograja | | Daljinec |
| | | | | | Straniščna deska, splakovalne tipke, ločilna stena | | Telefon |
| | | | | | Armature za tuš, pipe | | Stikalo za namizno svetilko |

S čim?*

Razkuževanje stranišč



*TASKI SANI 4 IN 1 PLUS***
*Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Razkuževanje sanitarij



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini




Čistilno razkužilo za okna in druge površine



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Univerzalno čistilno razkužilo



OXIVIR EXCEL
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POUŠČIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

*For viruses

**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to local availability

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Bivalne sobe – čiščenje ob odpustu

Opredelitev potencialnega tveganja: Po smrti varovanca zaradi bolezni COVID-19 ali drugih razlogov je treba opraviti globinsko čiščenje sobe, da bi se zagotovile higienske razmere za novega varovanca. Če so v sobi tudi drugi varovanci, jih je treba za čas izvajanja globinskega čiščenja premestiti drugam, da jih postopek ne bi motil. Osebe, ki pred vstopom v sobo ne izvaja higijene rok, obiskovalci, ki so bolni ali drugače vnašajo patogene, in vsi materiali ali oprema, ki se vnesejo v sobo, so prav tako potencialni prenašalci patogenov. Zato je treba opraviti temeljito globinsko čiščenje, da se zagotovi sprejemljiva raven higijene.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko v sobi varovanca med čiščenjem po odpustu.
2. Če je varovanec imel COVID-19, je pred začetkom čiščenja priporočljivo počakati vsaj 1 uro, razen če osebe uporablja zaščitno masko.
3. Vsi, ki vstopajo v sobo varovanca, morajo opraviti higieno rok in nositi rokavice med izvajanjem čistilnih opravil.
4. Osebne stvari varovanca je treba zapakirati v škatlo in dostaviti sorodnikom. Če obstaja tveganje, da so osebne stvari okužene s SARS-COV-2, je bolje, da namesto razkuževanja osebnih stvari škatle z njimi hranite 7 dni.
5. Treba je oprati vso posteljnino in mehke površine. Posteljno ogrodje je treba temeljito razkužiti. Za čiščenje preprog uporabite čistilnik z vročo vodo ali parni čistilnik.
6. Treba je očistiti in razkužiti vse površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo, vključno z ležiščem, skupnimi prostori v sobi, kopalnico in prostori za tuširanje.
7. Če sobo deli več varovancev, je treba očistiti in razkužiti tudi njihove površine, kot tudi zamenjati posteljnino.
8. Za stene in strope ni verjetno, da bi se jih osebe pogosto dotikale, zato štejejo za površine z nizkim tveganjem, vendar jih lahko razkužite, če želite.
9. Čistilno osebje mora uporabljati zaščitno masko, če med izvajanjem kemičnih postopkov obstaja nevarnost brizganja ali škropljenja.
10. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Sestrskasoba

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje


Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak

- Očistite in razkužite vse delovne površine, vključno z umivalniki in pipami (od manj onesaženih površin proti bolj onesaženim površinam)
- Očistite in razkužite podajalnike, stikala, ročaje omaric, mize, delovno postajo, namizni/prenosni računalnik, tipkovnico, tiskalnik, stole, okno, telefon
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte sobo, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano




2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Kako pogosto?



Na vsake 4 ure Računalniška oprema in telefoni – po vsaki uporabi



Stikala



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Pokrov koša za smeti



Telefon



Umivalnik, pipa



Pult



Ročaji omar



Računalniški zasloni, tipkovnica, miška,



Stoli

S čim? **

Razkužilo za umivalnike/pipe



OXIVIR EXCEL
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Čistilno razkužilo za talne površine



OXIVIR EXCEL
Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

*For viruses

**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to local availability

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Sestrskasoba

Opredelitev potencialnega tveganja: V teh prostorih se hkrati zadržuje več sester in drugega osebja. Čeprav so posode za hrano na splošno prepovedane, so posode za pijačo pogosto dovoljene. Glavna tveganja za medsebojno okužbo sester so neposredni stik ali kapljični prenos in delovna mesta, kjer obstaja možnost neposrednega kontaktnega prenosa. Skupna oprema (računalniki, spenjači itn.) predstavlja tveganje za prenos okužbe.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Postavljanje pregrad v delovnem prostoru ali izvajanje drugih ukrepov za omejevanje socialnih stikov med osebjem. Za omejitev tveganja za prenos patogenov lahko med sosednimi delovnimi mesti in nad pult postavite plastične prozorne pregrade.
2. Osebje naj uporablja maske v obdobjih povečanega tveganja.
3. Postavitev podajalnikov sredstva za higieno rok, umivalnikov za roke in znakov.
4. Postavitev podajalnikov robčkov za obraz in košev za smeti.
5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v določenem območju ne sme biti več kot X oseb hkrati.
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Javne sanitarije

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje


Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak

- Očistite in razkužite vse površine, vključno z ogledali, umivalniki in pipami (od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam)
- Očistite in razkužite podajalnike, stikala in kljuke
- Očistite in razkužite stranišča, vključno s straniščno desko in pokrovom ter splakovalnimi tipkami
- Očistite in razkužite pisoarje, vključno z ločilnimi stenami in splakovalnimi tipkami
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Ključke



Stikala



Površine, ki se jih dotikamo z rokami: podajalnik toaletnega papirja



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Umivalnik, pipa



Koš za smeti




Straniščne deske, ločilne stene

Kako pogosto?



Na vsaki 2 uri in kadar so umazane



S čim?*

Razkuževanje stranišč



TASKI SANI 4 IN 1 PLUS***
*Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Čistilno razkužilo za sanitarije



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Čistilno razkužilo za okna in druge površine



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Javne kopalnice/stranišča

Opredelitev potencialnega tveganja: Vsi poslovni obiskovalci in družinski člani varovanca bodo med obiskom verjetno uporabljali javne toaletne prostore. Pred vstopom v objekt je treba opraviti oceno zdravstvenega stanja obiskovalcev. Med osebjem in obiskovalci lahko pride do stika, kar ustvarja možnost za prenos patogenov. Kadar se vrata in kljuke toaletnih prostorov ne odpirajo samodejno, so ljudje prisiljeni, da se dotikajo istih površin. V straniščih ni sredstev za izvajanje higijene rok ali razkuževanje/čiščenje straniščne deske ali površin, ki se jih osebe pogosto dotikajo. Med uporabo umivalnikov lahko prihaja do škropljenja in mogoče so postavljeni preblizu skupaj, da bi bilo možno upoštevanje priporočil glede omejevanja socialnih stikov. Osebe morda uporabljajo toaletne prostore za obiskovalce, kar ustvarja dodatne možnosti za prenos patogenov s površin na roke.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Maske naj bodo na voljo za poslovne obiskovalce večino časa, njihova uporaba pa naj bo obvezna v obdobjih povečanega tveganja.
2. Kopalnice, ki ne omogočajo omejevanja socialnih stikov, je treba preurediti tako, da se takšno omejevanje zagotovi. Če to ni možno, lahko postavite znake za omejitev števila oseb, ki lahko hkrati uporabljajo kopalnico.
3. Uporaba stranišč je neločljivo povezana z visokim tveganjem za onesnaženje rok z urinom in iztrebki. V stranišča je treba postaviti razkužila za roke, kot tudi čistila/razkužila za straniščno desko.
4. Vrata je treba zamenjati, tako da ni potrebno ročno odpiranje. Druga možnost je, da vhod preoblikujete v obliki črke »Z«, brez uporabe vrat.
5. Pri umivalnikih naj bi že bili na voljo podajalniki sredstva za higieno rok.
6. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 9 izmenjav zraka na uro. Večje število izmenjav zraka bo prispevalo k odpravljanju neprijetnih vonjav.
8. Pogostost čiščenja kopalnic je treba določiti glede na število uporab na dan in stopnjo dovoljenega tveganja v objektu.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Prostori za človeške izločke

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO




1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

- Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
- Očistite in razkužite vse delovne površine, vključno z umivalniki in pipami: od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam
- Očistite in razkužite podajalnike, stikala in kljuge
- Očistite in razkužite stroj za pomivanje nočnih posod
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Podajalniki za milo (hrkati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Kljuge



Koš za smeti



Stikala



Umivalnik, pipe



Stroj za pomivanje nočnih posod



Delovne površine



Pohištveni ročaji



Police v omarici




Vrata

Kako pogosto?



Po vsaki uporabi prostora



S čim?*

Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Čiščenje nočnih posod



Suma Med Super Plus

Jonmaster Mini



RAZKUŽEVANJE PVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

*For viruses

**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to local availability

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavržite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Prostori za človeške izločke

Opredelitev potencialnega tveganja: Virus SARS-CoV-2 so odkrili v iztrebkih, vendar prenos preko iztrebkov ni bil potrjen. Zato pri vsakem delu z iztrebki obstaja možnost prenosa virusa. Fekalno-oralni prenos je pogost pri določenih virusih (npr. pri norovirusu), zato je treba izvajati previdnostne ukrepe za preprečevanje možnosti prenosa po tej poti. V objektih je mogoče ustaljena praksa praznjenja uporabljenih nočnih posod v stranišče ali druge enote za odstranjevanje iztrebkov pred postavljanjem v pomivalno enoto. V okviru tega postopka lahko pride do izpostavljanja okužbi na več točkah. Med izplakovanjem stranišč/enot za odstranjevanje iztrebkov lahko pride do nastanka bioaerosolov, ki se v kapljicah širijo na večje površine.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru za obdelavo nočnih posod, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Zaposleni, ki prenašajo uporabljene nočne posode, ne morejo izvesti higiene rok ob vstopu v prostor za obdelavo nočnih posod, vendar pa morajo opraviti higieno rok ob izhodu iz tega prostora.
3. Če se v objektu uporablja pravilo odstranjevanja iztrebkov v stranišče ali drugo enoto za odstranjevanje iztrebkov pred obdelavo v stroju za pomivanje nočnih posod, je treba uporabljati maske, halje in zaščito za oči.
4. Obdelanih nočnih posod ne smete hraniti na istem prostoru kot onesnažene nočne posode, ki čakajo na obdelavo.
5. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 10 izmenjav zraka na uro, pri čemer je zrak iz bližine stroja za pomivanje nočnih posod treba odvajati ven iz stavbe.
6. Osebu, ki dela z onesnaženimi zabojniki za odpadke, je treba zagotoviti ustrezno OVO (vsaj rokavice in halje)



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Mrtvašnica

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporablajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

- Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
- Očistite in razkužite vse delovne površine, vključno z umivalniki in pipami (od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam)
- Očistite in razkužite posteljni voziček in hladilne komore
- Očistite in razkužite podajalnike, stikala in kljuge
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano




2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Kako pogosto?



Po vsaki uporabi prostora



Hladilne komore



Stikala



Umivalnik, pipe



Miza



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Površine, ki se jih dotikamo z rokami



Kljuge



Podajalniki za brisače (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)

S čim? **

Razkužilo za umivalnike/pipe



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI SPRINT DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Mrtvašnica

Opredelitev potencialnega tveganja: V vseh objektih za dolgotrajno oskrbo se srečujejo s smrtjo svojih varovancev. Trupla še nekaj časa ohranijo določeno stopnjo tveganja za okužbo osebja in z njimi je treba ravnati spoštljivo, vendar tudi kot z možnim virom okužbe. Osebe, ki prihaja v stik s pokojnikom, mora nositi rokavice in halje. Če je v prostoru, kjer se nahajajo umrli, prišlo do razlitja telesnih tekočin, je med izvajanjem postopkov čiščenja potrebna uporaba zaščite za obraz (zaščite za oči in mask). Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v tem prostoru. Površine, ki se jih več oseb pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kadar je to primerno za osebe, še posebej pa v primerih, ko omejevanje socialnih stikov ni možno. Oblačila in tkanine, ki so v bližini umrlih, so lahko vektorji prenosa.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Po uporabi je treba vso opremo obrisati z razkužilom. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo osebju za uporabo za vse površine (in opremo), ki se jih pogosto dotika.
3. Osebe naj izvaja higieno rok ob vstopu v prostor in izhodu iz njega.
4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebo v obdobjih povečanega tveganja.
5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
6. Zagotavljanje OVO v neposredni bližini prostora, kot tudi zabojujnikov za uporabljeno OVO
7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
8. Uporabljene brisače, oblačila in druge tkanine so lahko okužene z virusi, zato je pri ravnanju z njimi potrebna uporaba ustreznih postopkov pranja.
9. Uporaba mrtvaških prtov/vreč



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Kuhinja

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak


- Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za smeti z modro krpo, če je potrebno.
- Očistite vse površine, ki so v stiku s hrano. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam.
- Izperite vse površine, ki so v stiku s hladno hrano, ki so bile očiščene z razkužilom.
- Očistite police omaric, napravo za odvod dima
- Očistite podajalnik za milo, podajalnike za čistila, stikala in kljuke
- Očistite tla

Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Površine, ki se jih dotikamo z rokami



Pipe



Pribor



Kljuke



Stikala



Podajalniki (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Površine v stiku s hrano




Police v omarici

Kako pogosto?



Na vsako uro in kadar so umazane



S čim?*

Čiščenje in razkuževanje kuhinje



SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Krpa Suma Lavette



Univerzalno čistilo



SUMA Multi D2
Doziranje: 5 ml

Brisalna krpa



Okna



TASKI Sprint Glass
Doziranje: pripravljeno za uporabo

Taski Versa Plus



Čistilo za pečico in žar



SUMA Grill D9
Doziranje: 100 %

Kratek program pomivanja posode



SUMA Nova Pur-Eco L6
Doziranje: 0,4–2 ml/l

Detergent za ročno pomivanje posode



SUMA STAR D1
Doziranje: 0,6 ml/l

Sredstvo za izpiranje



SUMA Rinse 5
Doziranje: 0,3–0,5 ml/l

RAZKUŽEVANJE PVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Čistilo za maščobe in tla



SUMA Break Up
Doziranje: 0,3–0,5 ml/l

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Kuhinja – površine za pripravo hrane

Opredelitev potencialnega tveganja: Domnevajo, da se virus SARS-CoV-2 ne prenaša prek hrane, vendar pa je pri respiratornih virusih med pripravo hrane možen prenos z okuženega osebjem na hrano. Potrebno je vsakodnevno preverjanje zdravstvenega stanja osebja in prepoved dela vsem bolnim zaposlenim. Osebjem mora uporabljati ustrezno OVO za preprečevanje okužbe hrane. Delovni prostori morajo omogočati ustrezno fizično razdaljo med zaposlenimi, ki delajo v istem prostoru.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v kuhinji in območjih za pripravo hrane, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja ali epidemije.
3. Sredstva za higieno rok (umivanje in razkuževanje z alkoholom) bi že morala biti na voljo, lahko pa bo potrebna postavitev dodatnih podajalnikov.
4. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
5. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 10 izmenjav zraka na uro.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Jedilni prostori

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO




1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

- Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
- Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za smeti z modro krpo, če je potrebno.
- Očistite vse površine, ki so v stiku s hrano. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam.
- Izperite vse površine, ki so v stiku s hladno hrano, ki so bile očiščene z razkužilom.
- Očistite police omaric
- Očistite podajalnik za milo, podajalnike za čistila, stikala in kljuke
- Očistite tla
- Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Vse kljuke (ne samo za vrata)



Stikala



Koš za smeti



Podajalnik (hkrati preverite, ali je poln, deluje in je čist)



Pladnji



Stoli




Mize

Kako pogosto?



Na vsake 4 ure in kadar so umazane



S čim?*

Čiščenje in razkuževanje kuhinje



SUMA BAC D10
*Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Krpa Suma Lavette



Čistilno razkužilo za talne površine



SUMA BAC D10
*Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Taski Versa Plus



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa



PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Jedilni prostori

Opredelitev potencialnega tveganja: Domnevajo, da se virus SARS-CoV-2 ne prenaša prek hrane, vendar pa je pri respiratornih virusih možen prenos z okuženega osebjem na varovance, s katerimi so v stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebjem in vsem, ki so bolni, prepovedati delo s hrano ali neposreden stik z varovanci. V večjem jedilnem prostoru je možna hkratna postrežba obrokov večjemu številu varovancev. Zaposleni se pogosto gibajo med varovanci, ne da bi izvajali higieno rok. Takšen način postrežbe in uživanja obrokov povečuje tveganje za širjenje virusov, ki so prisotni v slini, zlasti med varovanci, ki jejo pri isti mizi, in osebjem, ki jim pomaga. Površine v jedilnih prostorih, ki se jih varovanci pogosto dotikajo, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in osebjem, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v jedilnem prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v jedilni prostor. Osebjem naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno.
3. Za bolne varovance je treba zagotoviti postrežbo hrane v sobah, kadar je to možno.
4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebjem v obdobjih povečanega tveganja.
5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo za uporabo varovancem, obiskovalcem in osebjem. Za površine, ki naključno prihajajo v stik s hrano, je bolj priporočljiva uporaba razkužilnih robčkov.
8. Treba je omogočiti preprosto čiščenje jedilnih prostorov, vključno s talnimi površinami. Izogibati se je treba uporabi preprog v teh prostorih



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Soba za odmor osebja

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak

- Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za smeti z modro krpo, če je potrebno.
- Očistite vse površine, ki so v stiku s hrano. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam
- Očistite police omaric.
- Očistite podajalnik za milo
- Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke
- Očistite tla

Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Kako pogosto?



Na vsako uro in kadar so umazane



Vse kljuke (ne samo za vrata)



Stikala



Koš za smeti



Podajalnik (hkrati preverite, ali je poln, deluje in je čist)



Pladnji



Stoli



Miza



Hladilnik

S čim?*

Čiščenje in razkuževanje kuhinje



SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Krpa Suma Lavette



Čistilo za pečico in žar



SUMA Grill D9
Doziranje: 100 %

Brisalna krpa



Detergent za ročno pomivanje posode



SUMA STAR D1
Doziranje: 0,6 ml/l

Taski Versa Plus



Čistilno razkužilo za talne površine



SUMA BAC D10
Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Kratek program pomivanja posode



SUMA Nova Pur-Eco L6
Doziranje: 0,4–2 ml/l

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



SUMA BAC D10
*Doziranje: 1,5 %
Čas stika: 5 min

Sredstvo za izpiranje



SUMA Rinse 5
Doziranje: 0,3–0,5 ml/l

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Soba za odmor osebja

Opredelitev potencialnega tveganja: V teh prostorih se hkrati zadržuje več članov osebja. Ker zaposleni v teh prostorih uživajo hrano in pijačo, je večje tveganje za okužbo površin s slino. Zaposleni se lahko med seboj okužijo z neposrednim stikom ali kapljičnim prenosom in z neposrednim kontaktnim prenosom z miz in drugih skupnih površin. Skupna oprema (mikrovalovne pečice, kavni lončki itn.) predstavlja tveganje za prenos okužbe.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v tem prostoru. Osebje, ki je v prostoru, mora upoštevati pravila glede omejevanja socialnih stikov. Za omejitev tveganja za prenos patogenov lahko med sosednimi mizami postavite plastične prozorne pregrade.
2. Osebje naj uporablja maske v obdobjih povečanega tveganja.
3. Postavitev podajalnikov sredstva za higieno rok, umivalnikov za roke in znakov.
4. Postavitev podajalnikov robčkov za obraz in košev za smeti.
5. Postavitev znaka, ki opozarja, da v določenem območju ne sme biti več kot X oseb hkrati.
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro. V tem dokumentu navajamo število izmenjav zraka, ki je v uporabi v Severni Ameriki, in sicer kot referenco in za opozarjanje na pomen tega vprašanja. Vendar je pri določanju števila izmenjav zraka vedno treba upoštevati lokalne predpise.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Pralnica

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak


- Odstranite vrečo za odpadke in jo zamenjajte z novo. Obrišite koš za smeti z modro krpo, če je potrebno.
- Očistite vse kontaktne površine. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam
- Očistite police omaric.
- Očistite podajalnik za milo
- Očistite podajalnike, stikala in kljuke
- Očistite tla

Vzemite si 3 sekunde, da prostor pregledate, preden ga zapustite

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano




2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Kako pogosto?



Na vsake 4 ure in kadar so umazane



Miza



Vse kljuke



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Voziček za perilo



Stikala



Površina pralnega stroja



Polica

S čim?*

Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Pranje perila

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Zbiranje in pranje perila



Zbiranje perila
Zberite perilo iz prostorov, kjer se uporablja. Perilo zbirajte v ločenih vrečah/vozičkih; 1. brisače, 2. ravno perilo, 3. občutljivo perilo
Perilo je treba odlagati v vreče neposredno ob posteljah. Ni dovoljen prenos okuženega perila skozi prostore/oddelke.



Neprepustne vreče
Perilo je treba zbirati v neprepustnih vrečah. Te vreče morajo biti lahko prepoznavne (barvna oznaka ali etiketa). Odstranjenega perila nikoli ne prenašajte posamično, ampak ga odložite v neprepustno vrečo, kot je opisano zgoraj.




Sortiranje perila NI DOVOLJENO
Perila NI DOVOLJENO sortirati ali predhodno obdelovati, da se prepreči tveganje za okužbo delavcev.
Perilo je treba oprati neposredno po prispejtu v pralnico. Sortiranje in odstranjevanje madežev je dovoljeno izključno po čiščenju in razkuževanju.



Polnjenje pralnega stroja
Pralni stroj je treba napolniti z ustrezno količino umazanega perila (približno 85 % nazivne zmogljivosti pralnega stroja) in uporabiti priporočen program pranja. Za vse perilo je treba izvesti celoten postopek čiščenja in razkuževanja.

2. korak: Praznjenje pralnega stroja/sušenje



Zbiranje perila
Izpraznite perilo v voziček za ČISTO PERILO.



Čakalni čas < 30 min

Zbiranje perila
Čakalni čas med koncem pralnega postopka in začetkom sušenja ali likanja je treba skrajšati. Najdaljši čakalni čas [vlažno] = 30 minut.



Polnjenje/praznjenje sušilnega stroja
Sušilni stroj ustrezno napolnite glede na težo perila/čas sušenja. Zaradi predolgega sušenja se stvari lahko poškodujejo/razbarvajo. Sušilni stroji morajo imeti hladilno fazo, da se zmanjša mečkanje perila. Največja dovoljena vsebnost vlage – po sušenju – je 5 %.



Likanje ali zaključno kalandriranje
Največja dovoljena vsebnost vlage – po sušenju – je 5 %
Opomba: Škrobljenje namiznega perila predstavlja nesprejemljivo tveganje.

Kaj uporabiti za pranje?

Program 1: kemično-termično razkuževanje



Clax DS Desotherm
Encimski pralni prašek brez fosfatov/razkužilo.
Virucidna učinkovitost po EN 14476 (mišji parvovirus). Na voljo razvrstitev na seznamu RKI AB.

Program 2: kemično-termično razkuževanje



Clax Bright
Visokoučinkovito belilo/razkužilo za pranje pri nizki temperaturi. Vedno uporabljajte skupaj z detergentom.
Virucidna učinkovitost po EN 14476 (mišji parvovirus).

Program 3: kemično-termično razkuževanje



Clax Personril
Visokoučinkovito belilo/razkužilo za pranje pri srednji temperaturi. Vedno uporabljajte skupaj z detergentom.
Virucidna učinkovitost po EN 14476 (mišji parvovirus). Na voljo razvrstitev na seznamu RKI AB.

Program 4: kemično-termično razkuževanje



Clax Revoflow OXI
Visokoučinkovit detergent/razkužilo za pranje pri srednji temperaturi. Vedno uporabljajte skupaj z detergentom Clax Revoflow. Virucidna učinkovitost po EN 14476 (mišji parvovirus). Na voljo razvrstitev na seznamu RKI AB.

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

For viruses
In posameznih državah se postopek za pranje lahko razlikuje od priporočila SZO ali RKI. Availability

V posameznih državah se postopek za pranje lahko razlikuje od priporočila SZO ali RKI. Availability

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Pralnica

Pranje perila

Opredelitev potencialnega tveganja: Čeprav ni dokazov o prenosu SARS-CoV-2 preko umazanega perila, lahko varovanci, ki so zboleli za COVID-19, okužijo z virusom svoja oblačila in posteljnino. Pri delu z umazanim perilom je treba uporabljati OVO in upoštevati druge previdnostne ukrepe, da bi se preprečila naključna okužba osebja med pranjem perila. Izvajanje postopkov pranja po priporočilih programa Clax za okuženo perilo zagotavlja ustrezno higieničnost onesnaženih tkanin.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru za pranje perila, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Pretok zraka naj bi že potekal od manj onesnaženih preko bolj onesnaženih območjih navzven in dodatni pretok zraka ne sme vplivati na spremembo navedene smeri. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 12 izmenjav zraka na uro.
3. V prostorih za pranje perila mora osebje imeti dostop do sredstev za umivanje rok in alkoholnega razkužila za roke, morda pa bo potrebna postavitve dodatnih podajalnikov.
4. Pri delu z umazanim perilom v obdobjih povečanega tveganja uporabljajte OVO v skladu s smernicami lokalnih organov za javno zdravje, še posebej v primeru varovanca, pozitivnega na COVID-19.
5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
6. Potrebno je pogosto razkuževanje vozičkov za prevoz perila, sortirnih miz in delovne opreme.
7. Zaposlenim, ki niso vključeni v proces pranja, ne sme biti dovoljen vstop v prostore za pranje perila.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Skupni prostori in računalniška soba

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak

- Očistite vse mize in pipe (čistite od manj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam)
- Očistite stole, posebno natančno očistite naslonjala za roke na stoličih
- Očistite telefon, tipkovnico, miško
- Očistite podajalnike, stikala in kljuge
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Dvakrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika

Kako pogosto?



Na vsake 4 ure čež dan in kadar so umazane



Nasloni za roke naslanjačev



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Pohišveni ročaji



Mize



Pokrovi košev za smeti



Kljuge



Daljinec



Stikala



Stikalo za namizno svetilko



Skupna oprema za aktivnosti

S čim?*

Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Okna



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Sesalnik Aero 8



Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

*For viruses
**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to local availability

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Skupni prostori za varovance, kot so prostori za različne aktivnosti

Opredelitev potencialnega tveganja: Domnevajo, da se virus SARS-CoV-2 ne prenaša prek hrane, vendar pa je pri respiratornih virusih možen prenos med osebjem in varovanci, kadar so v tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v neposrednem stiku z varovanci. V večjem skupnem prostoru se lahko hkrati zadržujejo skupine varovancev in osebja, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Površine, ki se jih več varovancev pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v skupnem prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov. Pri postavitvi pregrad je treba paziti na njihovo vidnost za varovance, tako da ne predstavljajo varnostnega tveganja.
2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v skupni prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno.
3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v skupne prostore.
4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.
5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koži za smeti.
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo za uporabo varovancem, obiskovalcem in osebju. Za površine, ki naključno prihajajo v stik s hrano, je bolj priporočljiva uporaba razkužilnih robčkov.
8. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje preprog ni možno

Računalniška soba/spletna kavarna

Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in varovanci, kadar so v tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v neposrednem stiku z varovanci. V skupnem prostoru, kot je računalniška soba ali spletna kavarna, se lahko hkrati zadržujejo skupine varovancev in osebja, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Tveganje za širjenje patogenov preko površin v skupnih prostorih, ki se jih dotika več varovancev (kot so tablični računalniki, računalniške tipkovnice in miške ter drugi zasloni na dotik), se z vsakim dotikom dodatno povečuje. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v skupnem prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Računalnike, ki so med seboj oddaljeni manj kot 1 meter, je treba postaviti tako, da je med posameznimi delovnim postajami zagotovljen 2-metrski razmik. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v skupni prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno.
3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v skupne prostore.
4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.
5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koži za smeti.
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo za uporabo varovancem, obiskovalcem in osebju. Za površine, ki naključno prihajajo v stik s hrano, je bolj priporočljiva uporaba razkužilnih robčkov.
8. Vso skupno opremo je treba razkužiti za vsakim varovancem. Osebje naj se ne dotika opreme, dokler jej varovanci uporabljajo.
9. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje preprog ni možno.



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Prostori za fitnes

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO




1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

- Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
- Očistite vse mize. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam
- Očistite stole, opremo za fitnes
- Očistite fontane za pitje, podajalnike, stikala in kljuke
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Enkrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Umivalnik, pipe



Stranišče



Vse kljuke



Oprema za fitnes



Stikala



Koš za smeti




Garderobne omarice

Kako pogosto?



Po vsaki uporabi in kadar so umazane



S čim?*

Razkuževanje stranišča



TASKI SANI 4 IN 1 PLUS***
*Doziranje: 3 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Razkuževanje sanitarij



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Razkuževanje opreme za fitnes



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Čistilno razkužilo za okna in druge površine



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavržite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Prostori za fitness

Prostori za telovadbo/fitness/fizioterapijo

Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos respiratornega virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in varovanci, kadar so v tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v neposrednem stiku z varovanci. V prostoru za telovadbo/fitness ali fizioterapijo obstaja večja verjetnost, da bo prihajalo do daljšega tesnega stika. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično in kontaktno prenašajo respiratorne viruse. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v tem prostoru. Površine, ki se jih več oseb pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno za osebje. Pri umivanju las in izvajanju manikure/pedikure prihaja do tveganja za prenos virusov na roke in uniforme zaposlenih. Pri daljšem tesnem stiku med osebjem in varovanci, kot na primer med daljšim postopkom, lahko pride do povečanja tveganja za prenos virusov. Brisače in druga oblačila so lahko vektorji prenosa.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Za vsakim varovancem je treba vso opremo obrisati z razkužilom.
3. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno. Zaposleni, ki se gibajo med varovanci, morajo izvajati higieno rok.
4. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v ta prostor.
5. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.
6. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
7. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
8. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo varovancem, obiskovalcem in osebju za uporabo za vse površine (in opremo), ki se jih pogosto dotika.
9. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje preprog ni možno.
10. Uporabljene brisače, oblačila in druge tkanine so lahko okužene z virusi, zato je pri ravnanju z njimi potrebna uporaba ustreznih postopkov pranja. Uporabljene brisače in oblačila se ne smejo uporabljati za drugega varovanca.

Prostor za velnes ali hidroterapijo/bazeni

Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos respiratornega virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in varovanci, kadar so v tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v neposrednem stiku z varovanci. V velnesu, kadeh za hidroterapijo in masažo ali bazenu se lahko hkrati zadržuje več varovancev in zaposlenih, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Ker je varovancem pri prehajanju med različno opremo potrebna pomoč, prihaja do povečanja tveganja za okužbo rok in uniform. Površine, ki se jih več oseb pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično in kontaktno prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno za osebje. Med pomočjo uporabnikom pri sušenju po uporabi vodne terapije lahko pride do prenosa virusa z varovanceve kože na brisačo in morebitne okužbe rok in uniform zaposlenih. Za preprečevanje prenosa patogenov je lahko potrebna uporaba rokavic in halj. Pri daljšem tesnem stiku med osebjem in varovanci lahko pride do povečanja tveganja za prenos virusov.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno. Zaposleni, ki se gibajo med varovanci, morajo izvajati higieno rok.
3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v prostor za vodno terapijo.
4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.
5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo varovancem, obiskovalcem in osebju za uporabo za vse površine, ki se jih pogosto dotika.
8. Pred uporabo bazena ali potopnega bazena za hidroterapijo naj se varovanci okopajo ali oprhajo



Čiščenje in razkuževanje ob epidemiji

Lepotilni prostor

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO




1. korak: Opravite čiščenje/razkuževanje

- Uporabite ustrezno OVO in postavite opozorilni znak
- Očistite vse mize. Brišite v nasprotni smeri urnega kazalca od višje ležečih proti nižje ležečim površinam
- Očistite stole
- Očistite podajalnike, stikala in kljuke
- Odstranite vrečo za odpadke. Očistite in razkužite koš za smeti in vstavite novo vrečo.
- Pometite tla in odstranite vse odpadke
- Očistite in razkužite tla ter počakajte, da se posušijo
- Preglejte prostor, preden odstranite opozorilni znak

Kako pogosto?



Enkrat na dan in kadar je umazano



2. korak: Razkužite površine, ki se jih pogosto dotika



Stikala



Umivalnik, pipe



Površine, ki se jih dotikamo z rokami: Tipkovnica, računalnik, miška



Kljuke



Podajalniki za milo (hkrati preverite, ali so polni, delujejo in so čisti)



Mize, sprejemni pult, miza za manikuro



Nasloni za roke



Koš za smeti




Skupna oprema

Kako pogosto?



Po vsaki uporabi in kadar so umazane



S čim?*

Čistilno razkužilo za talne površine



TASKI DEGERM
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Krpa TASKI Ultra/TASKISUM



Razkužilo za umivalnike/pipe



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Brisalna krpa, nastavek in ročaj brisala



Čistilno razkužilo za okna in druge površine



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

Jonmaster Mini



Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin



OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

RAZKUŽEVANJE POVRŠIN, KI SE JIH POGOSTO DOTIKA

OXIVIR EXCEL
*Doziranje: 2 %
Čas stika: 5 min

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke



Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja

Lepotilni prostor

Opredelitev potencialnega tveganja: Prenos respiratornega virusa SARS-CoV-2 je možen med osebjem in varovanci, kadar so v tesnem stiku. Treba je vsakodnevno preverjati zdravstveno stanje osebja in vsem, ki so bolni, prepovedati delo v neposrednem stiku z varovanci. V salonu ali prostoru za lepotilno nego se lahko hkrati zadržujejo skupine varovancev in osebja, kar povečuje tveganje za prenos virusov. Površine, ki se jih več oseb pogosto dotika, lahko povečajo tveganje za širjenje patogenov. Varovanci in osebje, ki so na manjši medsebojni razdalji, lahko kapljično prenašajo respiratorne viruse. Treba je razmisliti o uporabi mask in drugih pregrad, kjer je to primerno za osebje. Pri umivanju las in izvajanju manikure/pedikure prihaja do tveganja za prenos virusov na roke in uniforme zaposlenih. Pri daljšem tesnem stiku med osebjem in varovanci, kot na primer med daljšim postopkom, lahko pride do povečanja tveganja za prenos virusov.

Ustaljeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje tveganja:

1. Treba je omejiti število varovancev in zaposlenih, ki so lahko hkrati v salonu/lepotilnem prostoru, tako da se med osebami v prostoru lahko zagotovi omejevanje socialnih stikov. Če je potrebno, razmislite o postavljanju pregrad in ograd za zmanjšanje tveganja za prenos patogenov.
2. Varovanci in zaposleni naj izvajajo higieno rok ob vstopu v salon/lepotilni prostor in izhodu iz njega. Osebje naj pri izvajanju higiene rok pomaga varovancem, ki tega ne morejo opraviti samostojno. Zaposleni, ki se gibajo med varovanci, morajo izvajati higieno rok.
3. Bolnim varovancem ne sme biti dovoljen vstop v salon/lepotilni prostor.
4. Treba je razmisliti o maskah za celotno osebje v obdobjih povečanega tveganja.
5. Na voljo morajo biti podajalniki robčkov za obraz in koši za smeti.
6. Zagotavljanje zadostnega prezračevanja, kot denimo najmanj 6 izmenjav zraka na uro.
7. Razkužilni robčki (ki se lahko varno uporabljajo) naj bodo na voljo varovancem, obiskovalcem in osebjem za uporabo za vse površine, ki se jih pogosto dotika.
8. Uporabi preprog v teh prostorih se je treba izogibati, ker učinkovito razkuževanje preprog ni možno.



Prostori za posebno obravnavo in postopki globinskega čiščenja



- Razkuževanje preprog
- Razkuževanje vzmetnic
- Odpravljanje neprijetnih vonjav
- Razkuževanje z UV svetlobo
- Odstranjevanje razlitij telesnih tekočin



RAZKUŽEVANJE PREPROG

PREĐ ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO



Po odpustu varovanca, pred ponovnim
odpiranjem sobe

WHEN?

IZDELKI, KI JIH LAHKO UPORABITE

Sredstvo za razkuževanje preprog

Priporočamo uporabo naslednjega sredstva, ki je preskušeno glede združljivosti in ima certifikat WoolSafe*



OXIVIR PLUS
Doziranje 1,5 %
Čas stika 5 min



Uporaba



Posesajte preprogo



Pripravite delovno raztopino razkužila. Raztopino zmerno razpršite po preprogi, vendar največ 40 do 50 m² naenkrat. Pustite učinkovati približno 5 minut. Poškropljena površina se ne sme posušiti.



Vlijte čisto vodo v rezervoar za svežo vodo na razpršilno-ekstrakcijski napravi.


Pozor: Uporabiti morate ekstrakcijsko krtačo

Naprave in pripomočki TASKI

TASKI
Aero 8

Sredstvo za preproge
TASKI Pro
30/45

Razpršilec
TASKI 7,5 l



Preprogo pršite in sesajte s pomikanjem nazaj, tako da se proge prekrivajo. Priporočljivo je, da preprogo pršite in posesate vsaj dvakrat oziroma tolikokrat, dokler voda v rezervoarju za povratno vodo ni čista. Če v rezervoarju za umazano vodo nastaja pena, uporabite sredstvo proti penjenju.



Vlakna preproge privzdignite s krtačo ali grabljami za preproge. Pustite, da se preproga popolnoma posuši. Čas sušenja je od 8 do 24 ur in hoja po preprogi je dovoljena šele po preteku tega časa.



Izpraznite razpršilnik, rezervoar za svežo in povratno vodo na razpršilno-ekstrakcijski napravi. Izperite rezervoarje s čisto vodo. Očistite naprave in kabel z vlažno krpo. Kabel ohlapno navijte.

- * Pred uporabo vedno preskusite detergent na neopaznem mestu, da preverite obstojnost barve in združljivost materiala.
- * Preverite razpoložljivost lokalnih sredstev. Preskušanje združljivosti je opravljeno na preprogah proizvajalca LANO

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
*for viruses
**All products shown are for illustration purpose only. Actual product may vary due to local availability

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavrzite uporabljene rokavice
3. Razkužite si roke

www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved

Check PIS, SDS for detailed information <http://sds.diversey.com>



RAZKUŽEVANJE VZMETNIC

Dnevno v primeru epidemije, če ni zaščitne prevleke

WHEN?

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke
2. Uporabljajte OVO



Izdelki, ki jih lahko uporabite

Čistilno razkužilo



Oxivir Excel



Doziranje: 2 %

Čas stika: 5 min

Čistilni pripomočki TASKI



Krpa TASKI Ultra ali TASKI SUM za enkratno uporabo

Uporaba



1. Odstranite prevleko za vzmetnico (če se uporablja).



2. V vedru/plastenki pripravite 2-odstotno raztopino sredstva Oxivir Excel in z njo namočite krpo.



3. Očistite in razkužite zaščitno prevleko za vzmetnico. Odstranite zaščitno prevleko.



4. Očistite in razkužite vzmetnico z raztopino. Čas stika naj bo 5 min.



5. Obrnite vzmetnico na drugo stran in ponovite postopek na tej strani.



6. Pustite, da se posuši na zraku, nato na vzmetnico navlecite zaščitno prevleko in prevleko (če se uporablja).

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavržite uporabljenе rokavice
3. Razkužite si roke



ODPRAVLJANJE NEPRIJETNIH VONJAV

Ponovno zagotovite sveže in prijetno okolje

IZDELKI, KI JIH LAHKO UPORABITE

Sredstva za odstranjevanje neprijetnih vonjav



Razpršilnik dišav Good Sense Nomad s patentirano tehnologijo aktivnega gela



Uporaba




Uporabite nerazredčeno za prizadeta območja. Nalijte **200 ml sredstva Good Sense Breakdown** v odvod umivalnika ali pisoarja in v druge odtoke. Počakajte, da preteče čas stika.



Uporablajte ga lahko kot dnevno čistilo za pisoarje brez vode kot 5 % razredčeno raztopino (2 potiska v 500 ml), ki ga razpršite po površinah in zdrgnete s krtačo pred izpiranjem.

Popolna odstranitev neprijetne vonjave v 30 minutah



Privzdignite poševni zgornji del razpršilnika Nomad, da ga odprete, in vstavite 1, 2 ali 3 sponke glede na velikost prostora (30/60/90 m²), ki ga želite osvežiti.



Priključite enoto v omrežno vtičnico. Intenzivnost dišave lahko uravnate z nastavitvijo moči motorja na podstavku enote. Sponke zamenjajte na vsakih 8–10 tednov.



Tehnologija razkuževanja MoonBeam™3 Disinfection Technology©

Tehnologija UV-C svetlobe: napredno ročno razkuževanje

IZDELKI, KI JIH LAHKO UPORABITE

Tehnologija razkuževanja Moonbeam™3



Uporaba po čiščenju in razkuževanju


WHEN?



Osnovno enoto postavite, na mesto, ki ga želite razkužiti. Zablockirajte kolesca, tako da pritisnete nožni vzvod. Zasukajte pokrov za daljinsko upravljanje, da ga odstranite z osnovne enote.



Priključite napajalni kabel v ozemljeno stensko vtičnico.



Premaknite MoonBeam™ 3 na površino za razkuževanje.



Ročice postavite v položaj obrnjenega »simbola miru« in nastavite kot luči tako, da vsaka ročica zajame površino velikosti 7' (2,1 m) krat 11' (3,3 m).



MoonBeam™ 3 bo izvajal razkuževanje ciljnega območja za čas trajanja, ki ste ga izbrali na osnovni enoti. Izberite cikel v trajanju 3 minut.



Pokrov za daljinsko upravljanje postavite izven sobe ob vratih. Pokrov za daljinsko upravljanje ima vgrajeno varnostno funkcijo, ki vključuje senzor bližine za zaznavanje odprtja vrat med delovanjem MoonBeam™ 3.



Pritisnite tipko za vklop in počakajte nekaj sekund, da se sistem pripravi za uporabo. Pritisnite tipko za zagon na pokrovu za daljinsko upravljanje, da zaženete cikel razkuževanja. Po zaključku razkuževanja bo na pokrovu za daljinsko upravljanje svetil indikator dokončanega postopka. Ciljna površina je zdaj razkužena in pripravljena za uporabo.



Za podrobnejše informacije o izdelku glejte uporabniški priročnik za MoonBeam™ 3.



ODSTRANJEVANJE RAZLITIJ TELESNIH TEKOČIN (TRDE TALNE IN DRUGE POVRŠINE)

PRED ČIŠČENJEM

1. Razkužite si roke 2. Uporabljajte OVO



Izdelki, ki jih lahko uporabite

Čistilno razkužilo




Oxivir Excel

Doziranje: 2 %


Čas stika: 5 min

V razpršilni plastenki

Uporaba



Sredstvo Oxivir Excel razpršite na prizadeta območja in okolico na oddaljenosti do 1 m, vključno s predmeti/ pohištvom. Čas stika naj bo 30 sekund.



Po mestu razlitja potresite zavoj absorpcijskih granul in počakajte, da granule vpijejo razlito tekočino.



Poberite granule z lopatico in jih odvrzite v vrečo za odpadke.

*Vsi izdelki so navedeni zgolj za ponazoritev. Izdelki, ki so dejansko na voljo, so lahko različni glede na lokalno razpoložljivost



Ponovite 1. korak, pri tem bodite pozorni na fuge in razpoke, saj se v njih lahko zadržujejo umazanija in bakterije. Čas stika naj bo 1 minuto.



Pustite, da se posuši na zraku.



Zavržite vse onesnažene materiale in varovalno opremo kot kontaminirane odpadke.



Očistite površino z ustreznim čistilom v skladu z režimom čiščenja.

PO ČIŠČENJU

1. Odložite umazane krpe v vrečo za umazano perilo
2. Zavržite uporabljenе rokavice
3. Razkužite si roke